

3 juni 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	Meeldauw ¹	0,01% (10 ml middel per 100 liter water)	0,15 l/ha	2 per 12 maanden	7	3
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	Meeldauw ¹	0,01% (10 ml middel per 100 liter water)	0,15 l/ha	2 per teeltcyclus	7	3
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Meeldauw ¹	0,01% (10 ml middel per 100 liter water)	0,15 l/ha	2 per 12 maanden	7	3
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> met uitzondering van paprika	Gewasbehandeling	Meeldauw ²	0,03% (30 ml middel per 100 liter water)	0,45 l/ha	2 per 12 maanden	7	3
Paprika	Gewasbehandeling	Meeldauw ²	0,03% (30 ml middel per 100 liter water)	0,3 l/ha	2 per 12 maanden	7	3

¹ *Sphaerotheca fuliginea*

² *Leveillula taurica*, *Oidium* spp.

Het gebruik in de bedekte teelt van aardbei en champignon is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardbei (bedekte, grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	Meeldauw ³	0,3 l/ha	0,3 l/ha	2 per 12 maanden	7	3
Aardbei (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	Meeldauw ³	0,3 l/ha	0,3 l/ha	2 per teeltcyclus	7	3
Champignon	Teeltbedbehandeling	Spinneweb-schimmel ⁴	100 ml in 15 liter water per 100 m ² teeltbed)	100ml/100 m ² teeltbed	1 per teeltcyclus	-	10

³ *Podosphaera aphanis* (syn. *Sphaerotheca macularis*)

⁴ *Dactylium dendroides* (syn. *Cladobotryum dendroides*)

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde champignons.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Selectiviteit

Mogelijke schade aan het gewas door toepassing van het middel Vivando kan niet in alle gewassen worden uitgesloten omdat niet in alle gewassen voldoende ervaring is opgedaan.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metrafenon. Metrafenon behoort tot de Benzophenonen. De FRAC code is U8.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.